



Contexto

A menudo se recomienda un tratamiento local con instilación vesical de mitomicina MMC (fármaco citotóxico) o BCG (bacillus Calmette-Guérin) después de la resección transuretral del tumor de vejiga (TURBT). Sin embargo, el manejo de estos medicamentos tóxicos requiere un alto nivel de seguridad para proteger al personal sanitario y su entorno. Los riesgos conocidos son:
Contaminación química y bacteriológica.



Fuga y/o derrame del medicamento durante la preparación, transferencia, instilación y eliminación.



Solución: qimocap – qimo♂ – qimoadapt

Para el manejo de medicamentos tóxicos, la gama Qimono garantiza un alto nivel de seguridad para el personal sanitario, desde el frasco del medicamento hasta la eliminación del catéter urinario.



qimocap



qimo♂



qimoadapt

TERAPIAS INTRAVASCULARES

Para más información, póngase en contacto con: preguntas@vygon.es

Las especificaciones que contiene este folleto son meramente informativas y no tienen, bajo ningún concepto, carácter contractual.

Vygon España

Calle Ciudad de Sevilla, 34

Polígono Fuente del Jarro 46988 PATERNA

Recepción: 902 876 288 Servicio contable: 961 344 364

Servicio de marketing: 961 344 745 Servicios comerciales: 902 876 288



www.vygon.com